

БЛИЦ - ОПРОС (Закрепление)

ТЕМА:

«Сестринский процесс при патологии костно-мышечной и соединительной ткани»

1. Диартрозы – это:

- а) полу подвижные суставы
- б) подвижные сочленения
- в) не подвижные сочленения

2. Артриты – это:

- а) поражение суставов, в основе которых лежит воспалительный процесс
- б) заболевание, в основе которого лежит дистрофический процесс
- в) новообразование костной ткани

3. При сборе информации у пациентов с патологией костно – мышечной системы выявляются все симптомы кроме:

- а) боли в суставах
- б) поражение мышц
- в) повышение температуры тела
- г) отеки на лице

4. Поражение мышц при патологии костно-мышечной и соединительной ткани проявляется:

- а) атрофией
- б) гипертрофией
- в) слабостью
- г) гипертонусом

5. При воспалительных заболеваниях суставов в крови обнаруживается:

- а) анемия, лейкопения
- б) миелобlastы
- в) лейкоцитоз, увеличенное СОЭ

6. Ревматоидный артрит – это:

- а) хроническое заболевание с преимущественным поражением мелких суставов и стойкой их деформацией.
- б) хроническое заболевание с преимущественным поражением крупных суставов.
- в) дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов.

7. Характер поражения суставов при ревматоидном артрите:

- а) волнообразный с периодами ремиссий и обострений
- б) летучесть болей
- в) симметричность поражения

8. Причины возникновения ревматоидного артрита:

- а) бета – гемолитический стрептококк
- б) выработка в организме особого белка
- в) «высыхание» хряща суставов

9. При поражении суставов при ревматоидном артрите присутствуют все симптомы, кроме:

- а) отечность сустава
- б) деформация сустава
- в) местная гиперемия кожи над суставом
- г) усиление болей при физической нагрузке, хруст в суставах

10. Для уточнения диагноза ревматоидного артрита используют дополнительные методы исследования:

- а) Rg – графию
- б) УЗИ
- в) цистоскопию

11. Для лечения ревматоидного артрита используют следующие группы препаратов:

- а) НПВС, диуретики
- б) цистостатики, НПВС
- в) анальгетики, спазмолитики

12. Правила приема НПВС:

- а) до еды, запивать молоком
- б) на ночь
- в) после еды
- г) до еды, запивать минеральной водой

13. При планировании ухода за пациентом с обострением ревматоидного полиартрита медсестра определила реальную цель ухода, связанную с ограничением активности пациента:

- а) у пациента исчезает деформация суставов
- б) исчезнут изменения на Rg – грамме
- в) при выполнении само ухода пациента будут меньше беспокоить боли в суставах
- г) у пациента полностью восстановится функция пораженных суставов

14. При объективном исследовании пациента с ревматоидным полиартритом медсестре следует обратить внимание на:

- а) чистоту кожных покровов
- б) конфигурацию суставов
- в) наличие отеков
- г) увеличение лимфатических узлов

15. При обследовании пациента с обострением ревматоидного артрита медсестра выделила приоритетную проблему:

- а) деформация суставов
- б) ограничение подвижности суставов

в) боли в суставах

16. С целью выявления побочных действий преднизолона медсестре следует наблюдать за:

- а) весом пациента и его внешним видом
- б) диурезом
- в) температурой
- г) характеристикой пульса

17. Для лечения ревматоидного артрита используют следующие препараты:

- а) ортофен, циклофосфан
- б) лазикс, аспаркам
- в) дигоксин, реопирин

18. При длительном применении НПВС с целью предупреждения побочных явлений медсестре следует справляться у пациента о следующих симптомах:

- а) отеках на лице
- б) диспептических явлениях
- в) головных болях
- г) головокружении, мелькании «мушек» перед глазами

19. Деформирующий остео~~арт~~роз – это:

- а) хроническое заболевание с преимущественным поражением мелких суставов
- б) хроническое заболевание с преимущественным поражением крупных суставов
- в) дегенеративно -дистрофическое заболевание суставов

20. Основным методом диагностики при деформирующем остеоартрозе является:

- а) ОАК
- б) биохимический анализ крови
- в) рентгенологическое исследование
- г) УЗИ

21. При лечении деформирующего остеоартроза применяют:

- а) румалон
- б) аспирин
- в) индометацин
- г) фуросемид

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

ТЕМА: « СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ ПАТОЛОГИИ КОСТНО –МЫШЕЧНОЙ И СОЕДИНİТЕЛЬНОЙ ТКАНИ»

В-3

1. Артриты – это заболевания, в основе которых лежит воспалительный процесс, локализующийся в синовиальной оболочке сустава, суставном хряще и околосуставных тканях.
2. При ревматоидном артрите органом-мишенью является сердце
3. При ревматоидном артрите поражаются преимущественно крупные суставы
4. При объективном исследовании пациента с ревматоидным артритом обращают на себя внимание конфигурация суставов.
5. К медикаментозным препаратам, препятствующим выработке «ревматоидного фактора» относится кризанол.
6. Побочным действием длительного приема кортикоステроидных гормонов является снижение АД.
7. При лечении ревматоидного артрита не медикаментозные методы лечения не имеют никакого значения.

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

ТЕМА: « СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ ПАТОЛОГИИ КОСТНО -МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ»

В-2

- 1.Ревматоидный артрит – это хроническое заболевание с преимущественным поражением мелких суставов.
2. Одними из основных жалоб при патологии костно-мышесной ткани являются отеки на ногах.
3. Боли в суставах при ревматоидном артрите носят летучий характер.
4. Мужчины чаще, чем женщины подвержены заболеванию ревматоидным артритом.
5. Предрасполагающими факторами для развития ревматоидного артрита являются ангина, ОРВИ.
6. Побочным действием длительного приема неастероидных противовоспалительных препаратов является развитие гастрита.
7. Для лечения ревматоидного артрита димексид противопоказан

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

ТЕМА: « СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ ПАТОЛОГИИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ»

ВАРИАНТ № 4

1. Симфизы – это полу подвижные суставы хрящевого типа, в котором кости соединены между собой волокнистым хрящем.
2. Ревматоидный артрит – это хроническое заболевание, приводящее к стойким деформациям пораженных суставов.
3. При ревматоидном артрите поражаются только мелкие суставы, крупные не подвержены изменениям
4. Причиной ревматоидного артрита является бета – гемолитический стрептококк группы А
5. Женщины чаще, чем мужчины подвержены заболеванию ревматоидным артритом
6. При лечении ревматоидного артритом применяют лаз икс, аспаркам
7. Побочным действием цитостатических препаратов является развитие лейкопении.

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

ТЕМА: « СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ ПАТОЛОГИИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ»

ВАРИАНТ № 4

1. Симфизы – это полу подвижные суставы хрящевого типа, в котором кости соединены между собой волокнистым хрящем.
2. Ревматоидный артрит – это хроническое заболевание, приводящее к стойким деформациям пораженных суставов.
3. При ревматоидном артрите поражаются только мелкие суставы, крупные не подвержены изменениям
4. Причиной ревматоидного артрита является бета – гемолитический стрептококк группы А
5. Женщины чаще, чем мужчины подвержены заболеванию ревматоидным артритом
6. При лечении ревматоидного артритом применяют лаз икс, аспаркам
7. Побочным действием цитостатических препаратов является развитие лейкопении.